

Semaine 9

Voir [HMU03] §7.1 et §7.2.

Clear Rounds = 33.33% (16 sur 48).

- ☒ On veut construire un AAP qui accepte tout mot $w \in \{c,d\}^*$ de la forme $ccc'd^*$ et tels que $|w|_c = 3 * |w|_d$. 47.92
 Une stratégie possible est d'empiler un symbole c à chaque fois qu'on lit un c en entrée. Puis, chaque fois qu'on lit en entrée un symbole d on va compter si dans la pile il y a au moins trois c .
 Par exemple on pourrait avoir la transition $\Delta(q_1, d, CCCZ_0) = \{(q_2, Z_0)\}$.
 ♣ On peut accéder qu'au symbole le plus "en haut" de la pile!
 On n'a pas le droit de connaître les autres symboles qui sont dans la pile.

Par exemple on pourrait avoir la transition $\Delta(q_1, d, CCCZ_0) = \{(q_2, Z_0)\}$.

Productions vides (I)

3.5.1 Définition (Symbole potentiellement vide)

Soit $G = (V, \Sigma, P, S)$ une grammaire non-contextuelle.
 Un symbole $A \in V$ est potentiellement vide si $A \Rightarrow_G^* \epsilon$.

3.5.2 Lemme Soit $G = (V, \Sigma, P, S)$ une grammaire non-contextuelle.
 Soit $V_\epsilon \subseteq V$ défini de manière inductive par :

$$\frac{(A \rightarrow \epsilon) \in P}{A \in V_\epsilon} \quad \frac{(A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_k) \in P \quad \forall i \in [1, k], B_i \in V_\epsilon}{A \in V_\epsilon}$$

Alors A est potentiellement vide ssi $A \in V_\epsilon$.

Productions vides (II)

3.5.3 Lemme (Elimination des ϵ -productions)

Soit $G = (V, \Sigma, P, S)$ une grammaire non-contextuelle, et $\Gamma = V \cup \Sigma$.
 Soit V_ϵ l'ensemble des symboles potentiellement vides.
 Soit $G' = (V, \Sigma, P', S)$ avec P' défini de manière inductive par :

$$\frac{(A \rightarrow \alpha) \in P \quad \alpha \in \Gamma^+}{(A \rightarrow \alpha) \in P'} \quad \frac{(A \rightarrow \gamma B \gamma') \in P \quad B \in V_\epsilon \quad \gamma \gamma' \in \Gamma^+}{(A \rightarrow \gamma \gamma') \in P'}$$

Alors $L(G') = L(G) \setminus \{\epsilon\}$.

Productions unitaires (I)

3.5.4 Définition (Production unitaire)

Soit $G = (V, \Sigma, P, S)$ une grammaire non-contextuelle.

Une production $(A \rightarrow \alpha) \in P$ est dite *unitaire* si $\alpha \in V$.

Deux variables $A, B \in V$ forment une *paire unitaire* (A, B) dans G ,

s'il existe une dérivation $A \Rightarrow_G^* B$ qui utilise uniquement des productions unitaires.

3.5.5 Lemme

Soit $G = (V, \Sigma, P, S)$ une grammaire non-contextuelle.

Soit $U_G \subseteq V \times V$ défini de manière inductive par :

$$\frac{A \in V}{(A, A) \in U_G}$$

$$\frac{(A, B) \in U_G \quad (B \rightarrow C) \in P}{(A, C) \in U_G}$$

Alors, (A, B) est une paire unitaire ssi $(A, B) \in U_G$

Productions unitaires (II)

3.5.6 Lemme (Élimination des productions unitaires)

Soit $G = (V, \Sigma, P, S)$ une grammaire non-contextuelle, et U_G l'ensemble des paires unitaires de G . Soit $G' = (V, \Sigma, P', S)$ la grammaire dont les productions P' sont telles que :

$$\frac{(A, B) \in U_G \quad (B \rightarrow \alpha) \in P \quad \alpha \notin V}{(A \rightarrow \alpha) \in P'}$$

Alors $L(G') = L(G)$

Symboles inutiles (I)

3.5.7 Définition (Symboles utiles)

Soit $G = (V, \Sigma, P, S)$ une grammaire non-contextuelle et $\Gamma = V \cup \Sigma$.

- Un symbole $X \in \Gamma$ est *génératif* s'il existe $w \in \Sigma^*$ tel que $X \Rightarrow_G^* w$.
- Un symbole $X \in \Gamma$ est *accessible* s'il existe $\alpha, \beta \in \Gamma^*$ tel que $S \Rightarrow_G^* \alpha X \beta$.
- Un symbole $X \in \Gamma$ est *utile* s'il est *génératif et accessible*. Sinon il est *inutile*.

Symboles inutiles (II)

3.5.8 Lemme

Soit $G = (V, \Sigma, P, S)$ une grammaire non-contextuelle, et $\Gamma = V \cup \Sigma$.

Soit $\Gamma_{\text{gen}} \subseteq \Gamma$ défini de manière inductive par :

$$\frac{s \in \Sigma}{s \in \Gamma_{\text{gen}}}$$

$$\frac{(A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_k) \in P \quad \forall i \in [1, k]. B_i \in \Gamma_{\text{gen}}}{A \in \Gamma_{\text{gen}}}$$

Soit $\Gamma_{\text{acc}} \subseteq \Gamma$ défini de manière inductive par :

$$\frac{S \in \Gamma_{\text{acc}}}{S \in \Gamma_{\text{acc}}}$$

$$\frac{A \in \Gamma_{\text{acc}} \quad (A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_k) \in P \quad i \in [1, k]}{B_i \in \Gamma_{\text{acc}}}$$

Alors

- $X \in \Gamma$ est *génératif* ssi $X \in \Gamma_{\text{gen}}$,
- $X \in \Gamma$ est *accessible* ssi $X \in \Gamma_{\text{acc}}$.

Symboles inutiles (III)

3.5.9 Lemme Soit $G = (V, \Sigma, P, S)$ une grammaire non-contextuelle et Γ_{gen} tel que défini au lemme 3.5.8. **Si $L(G) = \emptyset$, alors $S \notin \Gamma_{\text{gen}}$.**

Symboles inutiles (IV)

3.5.10 Lemme (Élimination des symboles inutiles)

Soit $G \triangleq (V, \Sigma, P, S)$ une grammaire non-contextuelle telle que $L(G) \neq \emptyset$ et Γ_{gen} tel que défini au lemme 3.5.8.

Soit $G' \triangleq (V', \Sigma, P', S)$ avec $V' \triangleq V \cap \Gamma_{\text{gen}}$, $\Gamma' \triangleq V' \cup \Sigma$ et P' tel que :

$$\frac{(A \rightarrow \alpha) \in P \quad A \in V' \quad \alpha \in \Gamma'^{*}}{(A \rightarrow \alpha) \in P'}$$

Soit Γ'_{acc} tel que défini (pour G') au lemme 3.5.8, et $G'' \triangleq (V'', \Sigma'', P'', S)$ avec $V'' \triangleq V' \cap \Gamma'_{\text{acc}}$, $\Sigma'' \triangleq \Sigma \cap \Gamma'_{\text{acc}}$, $\Gamma'' \triangleq V'' \cup \Sigma''$ et P'' tel que :

$$\frac{(A \rightarrow \alpha) \in P' \quad A \in V'' \quad \alpha \in \Gamma''^{*}}{(A \rightarrow \alpha) \in P''}$$

Alors :

- G'' ne contient que de symboles utiles
- $L(G) = L(G') = L(G'')$

pré - Chomsky

3.5.11 Proposition Soit G une grammaire non-contextuelle.

Soit G' la grammaire résultant de (dans cet ordre) :

- l'élimination des ϵ -productions selon le lemme 3.5.3,
- puis de l'élimination des productions unitaires selon le lemme 3.5.6
- et de l'élimination des symboles inutiles selon le lemme 3.5.10.

Alors, G' ne contient aucune ϵ -production, aucune production unitaire, et aucun symboles inutile.

Le but ...

3.5.12 Définition (Forme normale de Chomsky)

Soit $G = (V, \Sigma, P, S)$ une grammaire.

G est sous **forme normale de Chomsky (FNC)** si :

- $V \cup \Sigma$ ne contient pas de symboles inutiles.
- Les productions de P sont de l'une des formes suivantes :
 - $A \rightarrow BC$ avec $A, B, C \in V$
 - $A \rightarrow a$ avec $A \in V$ et $a \in \Sigma$.

Noter que si les trois transformations ne sont pas appliquées dans l'ordre donné alors la proposition n'est pas garantie.

3.5.13 Théorème (Chomsky)

Soit G une grammaire non-contextuelle telle que $L(G) \setminus \{\epsilon\} \neq \emptyset$. Alors, il existe une grammaire G' en FNC telle que $L(G') = L(G) \setminus \{\epsilon\}$.

La taille d'un arbre

3.6.1 Définition

La hauteur $h(t)$ d'un arbre $t \in \mathcal{T}_N$ est défini par :

$$\begin{aligned} h((n)) &= 0 \\ h((n t_1 \dots t_k)) &= 1 + \max\{h(t) \mid t \in \{t_1 \dots t_k\}\} \end{aligned}$$

3.6.2 Lemme Soit $G = (V, \Sigma, P, S)$ une grammaire en FNC.
Soit (t, ψ) un arbre de dérivation pour $w \in \Sigma$, et $n = h(t)$.
Alors, $|w| \leq 2^{n-1}$.

Gonflement non-contextuel

3.6.3 Théorème Soit Σ un alphabet et L un langage sur Σ .

Si L est non-contextuel, alors :

$\exists n \in \mathbb{N} : \forall z \in L : |z| \geq n \Rightarrow$

$$\left(\begin{array}{l} \exists u, v, w, x, y \in \Sigma^* : z = uvwxy \\ \wedge vx \neq \epsilon \\ \wedge |vwx| \leq n \\ \wedge \forall i \in \mathbb{N} : uv^iwx^iy \in L \end{array} \right)$$