

Exercice 1

Exercice 2 de la page 18 du cours.

Exercice 2

Exercice 3 de la page 18 du cours.

Exercice 3

Exercice 4 de la page 18 du cours.

Exercice 4

La fonction de Fibonacci est définie de la manière suivante :

$$\text{fib}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } x = 1 \\ \text{fib}(x - 1) + \text{fib}(x - 2) & \text{sinon} \end{cases}$$

Écrivez deux variantes d'une fonction calculant $\text{fib}(x)$: la première basée directement sur la définition ci-dessus, la seconde utilisant une récursion terminale.

Exercice 5

Pour élever un nombre x à une puissance y positive et entière, on peut utiliser la technique naïve qui consiste simplement à multiplier x avec lui-même y fois. Une meilleure solution utilise la propriété suivante de l'élevation à la puissance : x^y est égal à $(x^2)^{y/2}$ si y est pair. Écrivez une fonction d'élevation à la puissance tirant parti de cette propriété.

Exercice 6

On peut à l'aide de $(n + 1)$ points $\{x_i, y_i = f(x_i), i = 0, \dots, n\}$ construire le polynôme d'interpolation de Lagrange $P_n(x)$ de degré n :

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^n y_j L_j(x) \quad \text{avec} \quad L_j(x) = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n \frac{x - x_k}{x_j - x_k}$$

Utilisez les fonctions *sum* et *prod* définies dans l'exercice 3 pour écrire une fonction *lagrange*(*x* : *double*, *step* : *double*, *n* : *Int*, *f* : *double* => *double*) : *double* qui calcule $P_n(x)$ pour une fonction *f* donnée et testez votre solution au moyen de la fonction $f(x) = (1 + x^2 - x^3) e^{x/5}$ pour l'intervalle $[-1.0, 1.0]$.